

PFLICHTANGABEN NACH §4 HWG - FACHWERBUNG

Ibuprofen akut 400 mg Filmtabletten

Ibuprofen akut 400 mg Filmtabletten. Zusammensetzung: 1 Filmtbl. enthält.: *Wirkstoff:* Ibuprofen 400 mg. *Sonst. Bestandteile:* Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Povidon K 30, Maisstärke, Natriumdodecylsulfat, Magnesiumstearat, Hydroxypropylcellulose, Hypromellose, Macrogol 400, Titandioxid, 2-Propanol. **Anwendungsgebiete:** Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und Fieber. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gg. den Wirkstoff o. sonst. Bestandteile. Bekannte Reaktionen von Bronchospasmus, Asthma, Rhinitis, Urtikaria o. Angioödem nach der Einnahme von Acetylsalicylsäure o.a. NSARs i. d. Vergangenheit. Ungeklärte Blutbildungsstörungen. Bestehende o. i. d. Vergangenheit wiederholt aufgetretene peptische Ulzera o. Hämorrhagien. Gastrointestinale Blutungen o. Perforation i. d. Anamnese im Zusammenhang mit einer vorherigen Therapie mit NSARs. Zerebrovaskuläre o. a. aktive Blutungen. Schwere Leber- o. Nierenfunktionsstörungen. Schwere Herzinsuffizienz. Schwere Dehydratation. Schwangerschaft im letzten Drittel. Kinder unter 20 kg (6 Jahren). **Nebenwirkungen:** *Häufig:* Gastrointestinale Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Blähungen, Verstopfung, Verdauungsbeschwerden, abdominale Schmerzen, Teerstuhl, Hämatemesis. *Gelegentlich:* Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlägen und Hautjucken sowie Asthmaanfällen; Zentralnervöse Störungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Erregung, Reizbarkeit o. Müdigkeit; Sehstörungen; gastrointestinale Ulzera u. U. mit Blutung u. Durchbruch, ulzerative Stomatitis, Verstärkung einer Colitis u. eines Morbus Crohn; Gastritis. *Selten:* Tinnitus. *Sehr selten:* Verschlechterung infektiöser Entzündungen; Sympt. einer aseptischen Meningitis; Störungen der Blutbildung; schwere allg. Überempfindlichkeitsreaktionen; psychotische Reaktionen; Depression; Palpitationen, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt; arterielle Hypertonie; Ösophagitis; Pankreatitis; Ausbildung von intestinalen, diaphragmaartigen Strukturen; Leberfunktionsstörungen; Leberschäden; Leberversagen; akute Hepatitis; bullöse Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom u. toxisch epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom); Alopezie; Ödeme; nephrotisches Syndrom; interstitielle Nephritis, die mit einer akuten Niereninsuffizienz einhergehen kann; Papillennekrosen; erhöhte Harnsäurekonz. im Blut. *Nicht bekannt:* Arzneimittel-exanthem mit Eosinophilie u. systemischen Symptomen (DRESS); akute generalisierte exanthematische Pustulose; Lichtempfindlichkeitsreaktionen; geringfügig erhöhtes Risiko arterieller thrombotischer Ereignisse. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. **Warnhinweis:** Bei Schmerzen o. Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! **Abgabestatus:** Apothekenpflichtig. **Stand:** 02/2023. **Zul.-inh.:** Juta Pharma GmbH, Gutenbergstraße 13, 24941 Flensburg.

PFLICHTANGABEN NACH §4 HWG - LAIENWERBUNG

Ibuprofen akut 400 mg Filmtabletten

Ibuprofen akut 400 mg Filmtabletten. *Wirkstoff:* Ibuprofen. **Anwendungsgebiete:** Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und Fieber. **Warnhinweis:** Bei Schmerzen o. Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! **Verkaufsabgrenzung:** Apothekenpflichtig. **Stand:** 02/2023. **Zulassungsinhaber:** Juta Pharma GmbH, Gutenbergstraße 13, 24941 Flensburg.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.